

Achtung bei folgenden Medikamenten und CED

Diese Medikamente sollten von Betroffenen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung **NICHT** genommen werden. Bei Fragen und Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



Diese Liste gilt für die Präparate aller **Hersteller, alle Arzneiformen** der aufgeführten Wirkstoffe (egal ob Tablette, Zäpfchen, Injektion, Creme, sowie jede andere Form) und **alle Stärken** (Angabe in mg, forte, mite).

Wirkstoff	Produktname
Acemetacin	Tilur
Dexibuprofen	Seractil
Dexketoprofen	Kettesse
Diclofenac	AMAVITA Diclofenac Coop Vitality Diclofenac 25-N Diclofenac Ecofenac Flector Grofenac Inflamac Olfen SUN STORE Diclofenac Tonopan forte 25 mg Voltaren
Diclofenac/Misoprostol	Arthrotec
Etodolac	Lodine
Flurbiprofen	Angisil-X Dolo mint FlurbiAngin Sandoz Froben neo-angin dolo Strepsils
Ibuprofen	Alges-X Algifor Amavita Ibuprofen 400 Brufen Contra-Schmerz IL 400 Coop Vitality Ibuprofen 400 Dismenol Dolocyl forte Dolo-Spedifen Ibu Sandoz 400 Ibufelan Ibufen-L Ibuprofen Irfen Nurofen

Ibuprofen	Optifen Pretufen Saridon Sonotryl Neue Formel Spedifen Sun Store Ibuprofen 400 Treupel Dolo forte Ibuprofen 400
Indometacin	Indocid-Retard
Ketorolac	Tora-Dol
Mefenaminsäure	Mefenacid Mefenamin Pfizer Mefenaminsäure Sandoz Mephador 500 Neo Ponstan Spiralgin 500
Naproxen	Aleve Apranax Naproxen Mepha Proxen
Nimesulid	Aulin 100 Nisulid 100
Piroxicam	Felden Piroxicam-Mepha
Tenoxicam	Tilcotil

Bei den folgenden Medikamenten (Salicylate) ist das Risiko einer Unverträglichkeit noch nicht klar erforscht. In kleineren Dosen (wie z. B. bei «Aspirin cardio») sind Salicylate für CED-Betroffene vermutlich unproblematisch.

Salicylate, inkl. Kombinationen	Alca-C Alcacyl Alka-Seltzer Amavita Dolopirin-N ASA-Tabs Aspégic Aspirin Aspro 500 Contra-Schmerz plus Coop Vitality Acetylsalicylsäure 500 KAEX dolo
---------------------------------	---

COX-II selektive NSAR («Coxibe»)

COX-II selektive NSAR («Coxibe») gelten auch bei IBD als sicher und lösen höchstwahrscheinlich keine Schübe aus. Dies wurde in Studien bei Patienten mit IBD bewiesen. Nur im Falle eines zuvor beobachteten Zusammenhangs zwischen Einnahme von Coxiben und einem Schub sollte auch auf diese Medikamente verzichtet werden.

Celecoxib	Celebrex Celecoxib
Etoricoxib	Arcoxia